

PRÉVENTION AVANT LE VÊLAGE

1 JE TRAVAILLE À L'OBTENTION D'UN BON COLOSTRUM

- Attention à *l'alimentation* des vaches au tarissement
- Je les **vaccine** contre les agents de diarrhée
- Je **déparasite** les vaches :
 - Strongles / Grande Douve / Petite Douve / Paramphistomes

2 JE PRÉPARE LE BÂTIMENT POUR LES VÊLAGES À VENIR

- Je **cure** le bâtiment
- Je le **nettoie** puis le **désinfecte**
- Je respecte un **vide sanitaire** d'au moins 3 semaines

3 JE GÈRE MON TROUPEAU

- Pas plus de 40 vêlages par éleveur et par mois

PRÉVENTION AU VÊLAGE

1 JE RESPECTE L'HYGIÈNE AU VÊLAGE

- Je prévois une aire ou un **local** ne servant **que pour les vêlages**
 - Curé, désinfecté et paillé abondamment après chaque vêlage
- **J'interviens le moins possible** au vêlage
 - Utiliser une tenue spécifique, des bottes propres et des gants à usage unique
 - Nettoyer et désinfecter la vulve
- **Je désinfecte les cordons** ombilicaux des veaux
- **Je nettoie la mamelle** avant de tirer ou de faire prendre le colostrum

2 JE M'ASSURE DE LA BONNE PRISE DU COLOSTRUM

- Elle doit être **précoce et suffisante**
 - 1.5 à 2 litres dans les 2 premières heures
 - 10 % du poids du veau dans les 24 heures
 - Maxi 1.5 à 2 litres ou 5% du poids du veau par tétée
- Je prévois une **réserve de colostrum** congelé
- Je vérifie sa qualité à l'aide d'un **pèse colostrum**

PRÉVENTION APRÈS LE VÊLAGE

1 JE RESPECTE LES NORMES D'ÉLEVAGE

– Je maîtrise **la densité** :

VEAUX LAITIERS	VEAUX ALLAITANTS
<ul style="list-style-type: none">- 1.25 à 2.5 m²/ veau- Pas de case collective avant 8 jours- Maxi 8 à 10 veaux par case.	<ul style="list-style-type: none">- 10 m² par couple mère/veau- Maxi 8 couples par case

– J'allote par **classes d'âges**

- Idéalement 0 à 10 jours/ 10 jours à 1 mois/ + de 1 mois

– Je surveille **les conditions d'ambiance**

- Paillage quotidien / 1kg/m²
- Température :

NOUVEAUX-NÉS	PLUS DE 2 SEMAINES
10 à 25°C	5 à 25°C

- Attention à l'humidité et aux courants d'air : « Un courant d'air ressenti sur la main, c'est déjà trop pour un veau ! »

2 JE LIMITE LA PROPAGATION DES AGENTS PATHOGÈNES

– **Je désinfecte** les bottes et le matériel d'élevage

– **Je nettoie le matériel** après chaque buvée

– **J'isole** les malades

- Les traiter après les animaux sains
- Utiliser un matériel qui leur est réservé

– J'effectue une **quarantaine** lors d'achats (minimum 15 jours)